

# JEFO SECURE MET

|                 |   |
|-----------------|---|
| Назва:          | JEFO SECURE MET                               |
| Опис продукту:  | Мікроінкапсульований DL метіонін              |
| Класифікація:   | Премікс                                       |
| Застосування:   | ВРХ   |
| Діючі речовини: | DL метіонін та гідрогенізована рослинна олія. |

## Інгредієнти:

DL метіонін (3С301): 550 г/кг

## Метод виробництва:

Покриття запатентованим методом охоложеного розпилювання.

## Характеристики

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Зовнішній вигляд: | мікрогранули            |
| Колір:            | Від білого до кремового |
| Запах:            | легкий пряний           |

## Використання

Мікроінкапсульований метіонін для додавання до раціону харчування ВРХ.

## Дозування

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Дійні корови:  | 20-30 г/голову/день               |
| Вівці та кози: | 5 г/голову/день в період лактації |

## Упаковка

25 кг багатшарові паперові мішки з поліетиленовим покриттям в середині

## Зберігання

24 місяці з дати виробництва при зберіганні в оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці без потрапляння прямих сонячних променів.

# MET 55™

Форма випуску: гранульований порошок кремового кольору з характерним запахом метіоніну.

Упаковка: 25 кг багат шарові мішки з поліетиленовим покриттям всередині.

## ФАРМАКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Кормова добавка: амінокислоти

### КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- a. Вид тварин: ВРХ
- b. Показання до застосування: MET 55 використовується у якості добавки до раціону дійних корів. Метіонін являється чутливою до активності рубця амінокислотою. Споживання MET 55™ сприяє відновленню метіоніну в рубці.
- c. Протипоказання: побічні ефекти від вживання метіоніну спостерігаються вкрай рідко.
- d. Побічна реакція: спостерігається дуже рідко.
- e. Особливі застереження щодо використання: після вигодовування ретельно вимити руки. Уникати вдихання мікрочасток. Використовувати захисні рукавиці та окуляри. У випадку недостатньої вентиляції приміщення використовувати захист органів дихання. Не вживати в їжу, не пити і не палити під час використання продукту.
- f. Використання під час вагітності та лактації: може використовуватись під час вагітності та лактації за аналогічним дозуванням.
- g. Взаємодія з іншими лікарськими препаратами: у амінокислотах міститься сірка, цистеїн, гомоцистеїн та таурин хондроїтин сульфат та хрящові тканини
- h. Дозування та застосування тваринам різного віку: для забезпечення оптимального раціону MET 55 застосовувати дійним коровам у дозуванні 25-30 г/голову/день на розсуд спеціаліста по харчуванню.
- i. Передозування (симптоми, невідкладні заходи, протидії) – ознаки передозування стають видимі лише за 3 дні після вживання DL-метіоніну, еквівалентному 2,5% чи більше від загальної маси денного раціону. Таке дозування є зависоким, слід притримуватись рекомендованого дозування.
- j. Особливі застереження – будь-які ризики не виявлені.
- k. Виведення – продукт розроблений спеціально щоб уникнути травлення дійних корів, то ж особливих вказівок щодо виведення препарату з організму немає.
- l. Особливі вказівки щодо роботи персоналу з продуктом – відсутні.

### ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ:

- a. Несумісність: форма випуску продукту несумісна з прямим сонячним світлом, надмірною вологою та потраплянням води.
- b. Дата реалізації: термін зберігання – 24 місяці з дати виробництва за умови зберігання в оригінальній упаковці.
- c. Спеціальні умови зберігання: зберігати у сухому прохолодному місці, уникаючи прямих сонячних променів та інших джерел тепла.
- d. Оригінальна упаковка: Продукт відпускається у 25 кг багат шарових паперових мішках, закритих поліетиленом.
- e. Утилізація: утилізація продукту згідно місцевих вимог.